



Nutrición Animal



**BOVINOS DE CARNE / BOVINOS DE LECHE
OVINOS / EQUINOS / AVES / PORCINOS**

Probal s.a.

FB PB MAX Nutrición Animal



BOVINOS DE CARNE



Creep Feeding Cabaña

► Indicaciones de Uso:

Balanceado peletizado que en su formulación contempla los requerimientos nutricionales de los terneros desde las primeras semanas de vida hasta el destete. Ideal para ser usado en sistemas de Creep Feeding de cabaña. Comenzar a ofrecer a partir de los 10 días de vida en bajas cantidades (200 gramos). Ir aumentando gradualmente el consumo hasta llegar a 2 kg, cuando el ternero tenga 120 días.

► Aditivos:

Núcleo mineral de fuente orgánica, vitaminas, promotor de crecimiento, secuestrante de micotoxinas.

Destete Precoz Cabaña

► Indicaciones de Uso:

Balanceado peletizado que en su formulación contempla los requerimientos nutricionales de los terneros a partir de los 4 meses de vida. Producto ideal para hacer el destete precoz o recuperación de desmamantes. Ofrecer 1,0% hasta 1,5% del peso vivo. Si el suministro supera el 1,0% del P.V. se recomienda hacerlo fraccionando la dosis en 2 veces al día. Se necesita 1 metro de batea lineal con acceso a ambos lados para 4 desmamantes o 25 cm/desmamante con acceso a un lado. En sistema de semi confinamiento, mantener un suplemento mineral de crecimiento disponible en la batea.

► Aditivos:

Núcleo mineral de fuente orgánica, vitaminas, promotor de crecimiento, secuestrante de micotoxinas.

Composición Nutricional

NUTRIENTES	UNIDAD	BASE SECA
Energía Metabolizable (mín)	Kcal/kg	2.800
Extracto Etéreo (mín.)	%	3,40
Proteína Bruta (mín.)	%	22,00
Fibra Bruta (máx.)	%	6,80
Minerales Totales (máx.)	%	12,00
Calcio (mín.)	%	2,69
Fósforo (mín)	%	0,57
Magnesio (mín.)	%	0,01
Sodio (mín.)	%	0,40
Azufre (mín.)	%	0,04
Cobalto (mín.)	mg/kg	0,70
Cobre (mín.)	mg/kg	29,56
Cromo (mín.)	mg/kg	0,27
Hierro (mín.)	mg/kg	16,12
Yodo (mín.)	mg/kg	1,42
Manganeso (mín.)	mg/kg	97,82
Selenio (mín.)	mg/kg	0,86
Zinc (mín.)	mg/kg	127,92
Vitamina A (mín.)	UI/kg	21.500,00
Vitamina D (mín.)	UI/kg	2.690,00
Vitamina E (mín.)	UI/kg	67,18
Monensina Sódica (mín.)	mg/kg	32,25

Composición Nutricional

NUTRIENTES	UNIDAD	BASE SECA
Energía Metabolizable (mín)	Kcal/kg	2.900
Extracto Etéreo (mín.)	%	3,40
Proteína Bruta (mín.)	%	20,00
Fibra Bruta (máx.)	%	6,80
Minerales Totales (máx.)	%	12,00
Calcio (mín.)	%	1,55
Fósforo (mín)	%	0,76
Magnesio (mín.)	%	0,01
Sodio (mín.)	%	0,40
Azufre (mín.)	%	0,04
Cobalto (mín.)	mg/kg	0,73
Cobre (mín.)	mg/kg	30,75
Cromo (mín.)	mg/kg	0,28
Hierro (mín.)	mg/kg	16,77
Yodo (mín.)	mg/kg	1,48
Manganeso (mín.)	mg/kg	101,75
Selenio (mín.)	mg/kg	0,89
Zinc (mín.)	mg/kg	133,05
Vitamina A (mín.)	UI/kg	22.360,00
Vitamina D (mín.)	UI/kg	2.800,00
Vitamina E (mín.)	UI/kg	69,88
Monensina Sódica (mín.)	mg/kg	33,54

BOVINOS DE CARNE



Desmamante Cabaña

Indicaciones de Uso:

Balanceado peletizado que en su formulación contempla los requerimientos nutricionales de desmamantes. Producto ideal para hacer semi confinamiento o confinamiento de desmamantes machos (destete hasta 300 kg de peso). Ofrecer 1,0% hasta 1,5% del peso vivo. Si el suministro supera el 1,0% del P.V. se recomienda hacerlo fraccionando la dosis en 2 veces al día. Se necesita 1 metro de batea lineal con acceso a ambos lados para 4 desmamantes o 25 cm/desmamante con acceso a un lado. En sistema de semi confinamiento, mantener un suplemento mineral de crecimiento disponible en la batea.

Aditivos:

Núcleo mineral de fuente orgánica, vitaminas, promotor de crecimiento, secuestrante de micotoxinas.

Composición Nutricional

NUTRIENTES	UNIDAD	BASE SECA
Energía Metabolizable (mín)	Kcal/kg	3.000
Extracto Etéreo (mín.)	%	3,40
Proteína Bruta (mín.)	%	18,00
Fibra Bruta (máx.)	%	6,80
Minerales Totales (máx.)	%	12,00
Calcio (mín.)	%	1,57
Fósforo (mín)	%	0,74
Magnesio (mín.)	%	0,01
Sodio (mín.)	%	0,42
Azufre (mín.)	%	0,04
Cobalto (mín.)	mg/kg	0,73
Cobre (mín.)	mg/kg	30,77
Cromo (mín.)	mg/kg	0,28
Hierro (mín.)	mg/kg	16,79
Yodo (mín.)	mg/kg	1,48
Manganeso (mín.)	mg/kg	101,83
Selenio (mín.)	mg/kg	0,90
Zinc (mín.)	mg/kg	133,16
Vitamina A (mín.)	UI/kg	22.380,00
Vitamina D (mín.)	UI/kg	2.800,00
Vitamina E (mín.)	UI/kg	69,94
Monensina Sódica (mín.)	mg/kg	33,57

Bovino Reproductor Cabaña

Indicaciones de Uso:

Balanceado peletizado que en su formulación contempla los requerimientos nutricionales de los reproductores tanto machos como hembras. Su alto valor nutricional permite rápidas respuestas en animales sometidos a stress nutricionales o que necesitan recuperar rápidamente la condición nutricional. Especialmente formulado para cumplir con los requerimientos de los animales de cabaña y de aquellos que se preparan para exposición. Ofrecer 1,0% hasta 1,5% del peso vivo. Si el suministro supera el 1,0% del P.V. se recomienda hacerlo fraccionando la dosis en 2 veces al día. Se necesita 1 metro de batea lineal con acceso a ambos lados para 3 animales o 35 cm/animal con acceso a un lado. En sistema de semi confinamiento, mantener un suplemento mineral de reproducción disponible en la batea.

Aditivos:

Núcleo mineral de fuente orgánica, vitaminas, promotor de crecimiento, secuestrante de micotoxinas.

Composición Nutricional

NUTRIENTES	UNIDAD	BASE SECA
Energía Metabolizable (mín)	Kcal/kg	2.950
Extracto Etéreo (mín.)	%	3,40
Proteína Bruta (mín.)	%	19,00
Fibra Bruta (máx.)	%	6,80
Minerales Totales (máx.)	%	12,00
Calcio (mín.)	%	2,37
Fósforo (mín)	%	0,80
Magnesio (mín.)	%	0,01
Sodio (mín.)	%	0,25
Azufre (mín.)	%	0,04
Cobalto (mín.)	mg/kg	0,67
Cobre (mín.)	mg/kg	28,25
Cromo (mín.)	mg/kg	0,26
Hierro (mín.)	mg/kg	15,41
Yodo (mín.)	mg/kg	1,36
Manganeso (mín.)	mg/kg	93,47
Selenio (mín.)	mg/kg	0,82
Zinc (mín.)	mg/kg	122,24
Vitamina A (mín.)	UI/kg	20.540,00
Vitamina D (mín.)	UI/kg	2.570,00
Vitamina E (mín.)	UI/kg	64,20
Monensina Sódica (mín.)	mg/kg	30,82

BOVINOS DE CARNE



Creep Feeding Campo

► Indicaciones de Uso:

Balanceado peletizado con limitante de consumo. Su formulación contempla los requerimientos nutricionales de los terneros a partir de 30 días de edad hasta el destete precoz (4 meses) o normal (6 hasta 7 meses). Ideal para ser usado en sistemas de Creep Feeding en el Campo. Producto listo para uso. Comenzar a ofrecer a partir de los 30 días de vida dejando el producto a libre disposición en la batea, ya que el ternero regula su consumo, que es el esperado de 2 hasta 4 gramos/kg de peso vivo. No debe faltar el producto en la batea. Se necesita; batea= 4 hasta 8 cm/ternero (acceso a ambos lados). Dimensión del Creep Feeding= 1 hasta 2 m²/ternero.

► Aditivos:

Núcleo mineral de fuente orgánica, vitaminas, promotor de crecimiento, secuestrante de micotoxinas.

Destete Precoz Campo

► Indicaciones de Uso:

Balanceado peletizado que en su formulación contempla los requerimientos nutricionales de los terneros de campo a partir de los 4 meses de vida. Producto ideal para hacer el destete precoz o recuperación de desmamantes. Ofrecer 1,0% hasta 1,5% del peso vivo. Con ofrecimiento de 1% del peso vivo se puede hacer 1 vez al día ya 1,5% del peso vivo se recomienda hacer 2 veces al día. Se necesita 1 metro de batea linear con acceso a ambos lados para 4 desmamantes o 25 cm/desmamante con acceso a un lado. En sistema de semi confinamiento, mantener un suplemento mineral de crecimiento disponible en la batea.

► Aditivos:

Núcleo mineral de fuente orgánica, vitaminas, promotor de crecimiento, secuestrante de micotoxinas.

Composición Nutricional

NUTRIENTES	UNIDAD	BASE SECA
Energía Metabolizable (mín)	Kcal/kg	2.800
Extracto Etéreo (mín.)	%	3,40
Proteína Bruta (mín.)	%	22,00
Fibra Bruta (máx.)	%	6,8
Minerales Totales (máx.)	%	12,00
Calcio (mín.)	%	1,90
Fósforo (mín)	%	0,49
Magnesio (mín.)	%	0,01
Sodio (mín.)	%	2,40
Azufre (mín.)	%	0,04
Cobalto (mín.)	mg/kg	0,73
Cobre (mín.)	mg/kg	30,79
Cromo (mín.)	mg/kg	0,28
Hierro (mín.)	mg/kg	16,80
Yodo (mín.)	mg/kg	1,48
Manganeso (mín.)	mg/kg	101,89
Selenio (mín.)	mg/kg	0,90
Zinc (mín.)	mg/kg	133,24
Vitamina A (mín.)	UI/kg	35.830,00
Vitamina D (mín.)	UI/kg	4.140,00
Vitamina E (mín.)	UI/kg	83,42
Monensina Sódica (mín.)	mg/kg	33,59

Composición Nutricional

NUTRIENTES	UNIDAD	BASE SECA
Energía Metabolizable (mín)	Kcal/kg	2.800
Extracto Etéreo (mín.)	%	3,40
Proteína Bruta (mín.)	%	20,00
Fibra Bruta (máx.)	%	6,8
Minerales Totales (máx.)	%	12,00
Calcio (mín.)	%	1,32
Fósforo (mín)	%	0,81
Magnesio (mín.)	%	0,01
Sodio (mín.)	%	0,34
Azufre (mín.)	%	0,04
Cobalto (mín.)	mg/kg	0,58
Cobre (mín.)	mg/kg	24,57
Cromo (mín.)	mg/kg	0,22
Hierro (mín.)	mg/kg	13,40
Yodo (mín.)	mg/kg	1,18
Manganeso (mín.)	mg/kg	81,32
Selenio (mín.)	mg/kg	0,71
Zinc (mín.)	mg/kg	106,34
Vitamina A (mín.)	UI/kg	17.870,00
Vitamina D (mín.)	UI/kg	2.230,00
Vitamina E (mín.)	UI/kg	55,85
Monensina Sódica (mín.)	mg/kg	26,81

BOVINOS DE CARNE



Desmamante Campo

■ Indicaciones de Uso:

Balanceado peletizado que en su formulación contempla los requerimientos nutricionales de desmamantes de campo. Producto ideal para hacer semi confinamiento o confinamiento de desmamantes machos (destete hasta 300 kg de peso vivo) o hembras (destete hasta 250 kg de peso vivo). Ofrecer 1,0% hasta 1,5% del peso vivo. Con ofrecimiento de 1% del peso vivo se puede hacer 1 vez al día ya 1,5% del peso vivo se recomienda hacer 2 veces al día. Se necesita 1 metro de batea lineal con acceso a ambos lados para 4 desmamantes o 25 cm/desmamante con acceso a un lado. En sistema de semi confinamiento, mantener un suplemento mineral de crecimiento disponible en la batea.

■ Aditivos:

Núcleo mineral de fuente orgánica, vitaminas, promotor de crecimiento, secuestrante de micotoxinas.

Engorde Campo

■ Indicaciones de Uso:

Balanceado peletizado que en su formulación contempla los requerimientos nutricionales de engorde. Producto ideal para hacer semi confinamiento o confinamiento de machos (300 kg de peso vivo hasta la faena) o hembras (250 kg de peso vivo hasta la faena). Ofrecer 1,0% hasta 1,5% del peso vivo. Si el suministro supera el 1,0% del P.V. se recomienda hacerlo fraccionando la dosis en 2 veces al día. Se necesita 1 metro de batea lineal con acceso a ambos lados para 3 animales o 35 cm/animal con acceso a un lado. En sistema de semi confinamiento, mantener un suplemento mineral de engorde disponible en la batea.

■ Aditivos:

Núcleo mineral de fuente orgánica, vitaminas, promotor de crecimiento, secuestrante de micotoxinas.

Composición Nutricional

NUTRIENTES	UNIDAD	BASE SECA
Energía Metabolizable (mín)	Kcal/kg	2.900
Extracto Etéreo (mín.)	%	3,40
Proteína Bruta (mín.)	%	18,00
Fibra Bruta (máx.)	%	10,00
Minerales Totales (máx.)	%	10,00
Calcio (mín.)	%	1,33
Fósforo (mín)	%	0,84
Magnesio (mín.)	%	0,01
Sodio (mín.)	%	0,34
Azufre (mín.)	%	0,04
Cobalto (mín.)	mg/kg	0,58
Cobre (mín.)	mg/kg	24,61
Cromo (mín.)	mg/kg	0,22
Hierro (mín.)	mg/kg	13,43
Yodo (mín.)	mg/kg	1,18
Manganeso (mín.)	mg/kg	81,45
Selenio (mín.)	mg/kg	0,72
Zinc (mín.)	mg/kg	106,52
Vitamina A (mín.)	UI/kg	17.900,00
Vitamina D (mín.)	UI/kg	2.240,00
Vitamina E (mín.)	UI/kg	55,94
Monensina Sódica (mín.)	mg/kg	26,85

Composición Nutricional

NUTRIENTES	UNIDAD	BASE SECA
Energía Metabolizable (mín)	Kcal/kg	3.100
Extracto Etéreo (mín.)	%	3,40
Proteína Bruta (mín.)	%	16,00
Fibra Bruta (máx.)	%	6,80
Minerales Totales (máx.)	%	12,00
Calcio (mín.)	%	1,59
Fósforo (mín)	%	0,71
Magnesio (mín.)	%	0,01
Sodio (mín.)	%	0,44
Azufre (mín.)	%	0,04
Cobalto (mín.)	mg/kg	0,73
Cobre (mín.)	mg/kg	30,80
Cromo (mín.)	mg/kg	0,28
Hierro (mín.)	mg/kg	16,80
Yodo (mín.)	mg/kg	1,48
Manganeso (mín.)	mg/kg	101,91
Selenio (mín.)	mg/kg	0,90
Zinc (mín.)	mg/kg	133,26
Vitamina A (mín.)	UI/kg	22.400,00
Vitamina D (mín.)	UI/kg	2.800,00
Vitamina E (mín.)	UI/kg	69,99
Monensina Sódica (mín.)	mg/kg	33,60

BOVINOS DE CARNE



Terminación Campo

► Indicaciones de Uso:

Balanceado peletizado que en su formulación contempla los requerimientos nutricionales de fase de terminación. Producto ideal para hacer semi confinamiento o confinamiento de machos (420 kg de peso vivo hasta la faena) o hembras (350 kg de peso vivo hasta la faena). Ofrecer 1,0% hasta 1,5% del peso vivo. Con ofrecimiento de 1% del peso vivo se puede hacer 1 vez al día ya 1,5% del peso vivo se recomienda hacer 2 veces al día. Se necesita 1 metro de batea lineal con acceso a ambos lados para 3 animales o 35 cm/animal con acceso a un lado. En sistema de semi confinamiento, mantener un suplemento mineral de engorde disponible en la batea.

► Aditivos:

Núcleo mineral de fuente orgánica, vitaminas, promotor de crecimiento, secuestrante de micotoxinas.

Bovino Complex

► Indicaciones de Uso:

Balanceado peletizado que en su formulación contempla los requerimientos nutricionales para animales en fase de recría o engorde. Producto ideal para hacer semi confinamiento de machos o hembras en fase de recría o engorde. Ofrecer 0,5% hasta 1,0% del peso vivo una vez al día o fraccionando la dosis en 2 veces al día. Se necesita 1 metro de batea lineal con acceso a ambos lados para 3 animales o 35 cm/animal con acceso a un lado. En sistema de semi confinamiento, mantener un suplemento mineral de engorde disponible en la batea.

► Aditivos:

Núcleo mineral de fuente orgánica, vitaminas, promotor de crecimiento, secuestrante de micotoxinas.

Composición Nutricional

NUTRIENTES	UNIDAD	BASE SECA
Energía Metabolizable (mín)	Kcal/kg	3.200
Extracto Etéreo (mín.)	%	3,40
Proteína Bruta (mín.)	%	12,00
Fibra Bruta (máx.)	%	10,00
Minerales Totales (máx.)	%	12,00
Calcio (mín.)	%	1,36
Fósforo (mín)	%	0,85
Magnesio (mín.)	%	0,01
Sodio (mín.)	%	0,35
Azufre (mín.)	%	0,04
Cobalto (mín.)	mg/kg	0,58
Cobre (mín.)	mg/kg	24,65
Cromo (mín.)	mg/kg	0,22
Hierro (mín.)	mg/kg	13,45
Yodo (mín.)	mg/kg	1,18
Manganeso (mín.)	mg/kg	81,57
Selenio (mín.)	mg/kg	0,72
Zinc (mín.)	mg/kg	106,67
Vitamina A (mín.)	UI/kg	17.930,00
Vitamina D (mín.)	UI/kg	2.240,00
Vitamina E (mín.)	UI/kg	56,03
Monensina Sódica (mín.)	mg/kg	26,89

Composición Nutricional

NUTRIENTES	UNIDAD	BASE SECA
Energía Metabolizable (mín)	Kcal/kg	3.050
Extracto Etéreo (mín.)	%	3,40
Proteína Bruta (mín.)	%	17,00
Fibra Bruta (máx.)	%	6,80
Minerales Totales (máx.)	%	12,00
Calcio (mín.)	%	2,30
Fósforo (mín)	%	0,66
Magnesio (mín.)	%	0,01
Sodio (mín.)	%	0,35
Azufre (mín.)	%	0,01
Cobalto (mín.)	mg/kg	0,14
Cobre (mín.)	mg/kg	6,13
Cromo (mín.)	mg/kg	0,06
Hierro (mín.)	mg/kg	3,34
Yodo (mín.)	mg/kg	0,29
Manganeso (mín.)	mg/kg	20,29
Selenio (mín.)	mg/kg	0,18
Zinc (mín.)	mg/kg	26,53
Vitamina A (mín.)	UI/kg	4.460,00
Vitamina D (mín.)	UI/kg	560,00
Vitamina E (mín.)	UI/kg	13,93
Monensina Sódica (mín.)	mg/kg	6,69

BOVINOS DE CARNE



Bovino Reproductor Campo

Indicaciones de Uso:

Balanceado peletizado que en su formulación contempla los requerimientos nutricionales de los reproductores de campo tanto machos como hembras. Su alto valor nutricional permite rápidas respuestas en animales sometidos a stress nutricional o que necesitan recuperar rápidamente la condición nutricional. Especialmente formulado para cumplir con los requerimientos de toros, vacas o vaquillas para reproducción. Ofrecer 1,0% hasta 1,5% del peso vivo. Con ofrecimiento de 1% del peso vivo se puede hacer 1 vez al día ya 1,5% del peso vivo se recomienda hacer 2 veces al día. Se necesita 1 metro de batea lineal con acceso a ambos lados para 3 animales o 35 cm/animal con acceso a un lado. En sistema de semi confinamiento, mantener un suplemento mineral de reproducción disponible en la batea.

Aditivos:

Núcleo mineral de fuente orgánica, vitaminas, promotor de crecimiento, secuestrante de micotoxinas.

Energético Oriental

Indicaciones de Uso:

Suplemento mineral de auto consumo que en su formulación contempla los requerimientos nutricionales ideales para animales en fase de recría, engorde, terminación o reproducción manejados en pastura verde o seca. Productos listo para uso. No necesita adaptación. dejar el producto disponible para que el animal regule el consumo (auto consumo). No debe faltar el producto en la batea. Consumo esperado 50 hasta 150 gramos/100 kg de peso vivo. Se necesita de 4 hasta 12 cm lineal/animal de batea.

Aditivos:

Núcleo mineral de fuente orgánica, vitaminas, promotor de crecimiento, secuestrante de micotoxinas.

Composición Nutricional

NUTRIENTES	UNIDAD	BASE SECA
Energía Metabolizable (mín)	Kcal/kg	2.850
Extracto Etéreo (mín.)	%	3,40
Proteína Bruta (mín.)	%	19,00
Fibra Bruta (máx.)	%	10,00
Minerales Totales (máx.)	%	12,00
Calcio (mín.)	%	2,23
Fósforo (mín)	%	0,81
Magnesio (mín.)	%	0,01
Sodio (mín.)	%	0,23
Azufre (mín.)	%	0,03
Cobalto (mín.)	mg/kg	0,54
Cobre (mín.)	mg/kg	22,74
Cromo (mín.)	mg/kg	0,21
Hierro (mín.)	mg/kg	12,4
Yodo (mín.)	mg/kg	1,09
Manganeso (mín.)	mg/kg	75,24
Selenio (mín.)	mg/kg	0,66
Zinc (mín.)	mg/kg	98,39
Vitamina A (mín.)	UI/kg	16.540
Vitamina D (mín.)	UI/kg	2.070
Vitamina E (mín.)	UI/kg	51,68
Monensina Sódica (mín.)	mg/kg	24,80

Composición Nutricional

NUTRIENTES	UNIDAD	BASE SECA
Energía Metabolizable (mín)	Kcal/kg	2.000
Extracto Etéreo (mín.)	%	3,40
Proteína Bruta (mín.)	%	6,50
Fibra Bruta (máx.)	%	6,80
Minerales Totales (máx.)	%	52,00
Calcio (mín.)	%	68,00
Fósforo (mín)	%	19,70
Magnesio (mín.)	%	1,00
Sodio (mín.)	%	60,70
Azufre (mín.)	%	4,30
Cobalto (mín.)	mg/kg	7,03
Cobre (mín.)	mg/kg	297,43
Cromo (mín.)	mg/kg	2,70
Hierro (mín.)	mg/kg	162,23
Yodo (mín.)	mg/kg	14,28
Manganeso (mín.)	mg/kg	984,22
Selenio (mín.)	mg/kg	8,65
Zinc (mín.)	mg/kg	1.287,05
Vitamina A (mín.)	UI/kg	216.310,00
Vitamina D (mín.)	UI/kg	27.040,00
Vitamina E (mín.)	UI/kg	675,97
Monensina Sódica (mín.)	mg/kg	324,47

BOVINOS DE CARNE



Proteico Energético Oriental

■ Indicaciones de Uso:

Suplemento mineral de auto consumo que en su formulación contempla los requerimientos nutricionales ideales para animales en fase de recría, engorde, terminación o reproducción manejados en pastura verde o seca. Productos listo para uso. No necesita adaptación. dejar el producto disponible para que el animal regule el consumo (auto consumo). No debe faltar el producto en la batea. Consumo esperado 50 hasta 150 gramos/100 kg de peso vivo. Se necesita de 4 hasta 12 cm lineal/animal de batea.

■ Aditivos:

Núcleo mineral de fuente orgánica, vitaminas, promotor de crecimiento, secuestrante de micotoxinas.

Composición Nutricional

NUTRIENTES	UNIDAD	BASE SECA
Energía Metabolizable (mín)	Kcal/kg	1.800
Extracto Etéreo (mín.)	%	3,40
Proteína Bruta (mín.)	%	25,00
Fibra Bruta (máx.)	%	6,80
Minerales Totales (máx.)	%	52,00
Calcio (mín.)	%	67,20
Fósforo (mín)	%	19,50
Magnesio (mín.)	%	1,00
Sodio (mín.)	%	51,80
Azufre (mín.)	%	4,30
Cobalto (mín.)	mg/kg	6,99
Cobre (mín.)	mg/kg	295,67
Cromo (mín.)	mg/kg	2,69
Hierro (mín.)	mg/kg	161,27
Yodo (mín.)	mg/kg	14,19
Manganeso (mín.)	mg/kg	978,40
Selenio (mín.)	mg/kg	8,60
Zinc (mín.)	mg/kg	1.279,45
Vitamina A (mín.)	UI/kg	215.030,00
Vitamina D (mín.)	UI/kg	26.880,00
Vitamina E (mín.)	UI/kg	671,98
Monensina Sódica (mín.)	mg/kg	322,55

Proteico Oriental

■ Indicaciones de Uso:

Suplemento mineral de auto consumo que en su formulación contempla los requerimientos nutricionales ideales para animales en fase de recría, engorde, terminación o reproducción manejados en pastura verde o seca. Productos listo para uso. hacer la adaptacion de los animales por 7 días ofreciendo 50 gramos del producto/100 kg de peso vivo por día. Después de la adaptación dejar el producto disponible para que el animal regule el consumo (auto consumo). No debe faltar el producto en la batea. Consumo esperado después de la adaptación: 50 hasta 150 gramos/100 kg de peso vivo. Se necesita de 4 hasta 12 cm lineal/animal de batea.

■ Aditivos:

Núcleo mineral de fuente orgánica, vitaminas, promotor de crecimiento, secuestrante de micotoxinas.

Composición Nutricional

NUTRIENTES	UNIDAD	BASE SECA
Energía Metabolizable (mín)	Kcal/kg	1.700
Extracto Etéreo (mín.)	%	3,40
Proteína Bruta (mín.)	%	40,00
Fibra Bruta (máx.)	%	6,80
Minerales Totales (máx.)	%	52,00
Calcio (mín.)	%	66,50
Fósforo (mín)	%	19,30
Magnesio (mín.)	%	1,00
Sodio (mín.)	%	43,10
Azufre (mín.)	%	4,30
Cobalto (mín.)	mg/kg	6,96
Cobre (mín.)	mg/kg	294,32
Cromo (mín.)	mg/kg	2,68
Hierro (mín.)	mg/kg	160,54
Yodo (mín.)	mg/kg	14,13
Manganeso (mín.)	mg/kg	973,93
Selenio (mín.)	mg/kg	8,56
Zinc (mín.)	mg/kg	1.273,60
Vitamina A (mín.)	UI/kg	214.050,00
Vitamina D (mín.)	UI/kg	26,760,00
Vitamina E (mín.)	UI/kg	668,91
Monensina Sódica (mín.)	mg/kg	321,07

BOVINOS DE CARNE



Energético Chaco

Indicaciones de Uso:

Suplemento mineral de auto consumo que en su formulación contempla los requerimientos nutricionales ideales para animales en fase de recría, engorde, terminación o reproducción manejados en pastura verde o seca. Productos listo para uso. No necesita adaptación. dejar el producto disponible para que el animal regule el consumo (auto consumo). No debe faltar el producto en la batea. Consumo esperado 50 hasta 150 gramos/100 kg de peso vivo. Se necesita de 4 hasta 12 cm lineal/animal de batea.

Aditivos:

Núcleo mineral de fuente orgánica, vitaminas, promotor de crecimiento, secuestrante de micotoxinas.

Composición Nutricional

NUTRIENTES	UNIDAD	BASE SECA
Energía Metabolizable (mín)	Kcal/kg	2.000
Extracto Etéreo (mín.)	%	3,40
Proteína Bruta (mín.)	%	6,50
Fibra Bruta (máx.)	%	6,80
Minerales Totales (máx.)	%	40,00
Calcio (mín.)	g/kg	32,00
Fósforo (mín)	g/kg	11,00
Magnesio (mín.)	g/kg	0,40
Sodio (mín.)	g/kg	45,00
Azufre (mín.)	g/kg	1,80
Cobalto (mín.)	mg/kg	2,90
Cobre (mín.)	mg/kg	121,00
Cromo (mín.)	mg/kg	1,10
Hierro (mín.)	mg/kg	66,00
Yodo (mín.)	mg/kg	5,30
Manganeso (mín.)	mg/kg	400,00
Selenio (mín.)	mg/kg	3,50
Zinc (mín.)	mg/kg	524,00
Vitamina A (mín.)	UI/kg	88.150,00
Vitamina D (mín.)	UI/kg	11.000,00
Vitamina E (mín.)	UI/kg	275,00
Monensina Sódica (mín.)	mg/kg	132,00

Proteico Energético Chaco

Indicaciones de Uso:

Suplemento mineral de auto consumo que en su formulación contempla los requerimientos nutricionales ideales para animales en fase de recría, engorde, terminación o reproducción manejados en pastura verde o seca. Productos listo para uso. No necesita adaptación. dejar el producto disponible para que el animal regule el consumo (auto consumo). No debe faltar el producto en la batea. Consumo esperado 50 hasta 150 gramos/100 kg de peso vivo. Se necesita de 4 hasta 12 cm lineal/animal de batea.

Aditivos:

Núcleo mineral de fuente orgánica, vitaminas, promotor de crecimiento, secuestrante de micotoxinas.

Composición Nutricional

NUTRIENTES	UNIDAD	BASE SECA
Energía Metabolizable (mín)	Kcal/kg	1.800
Extracto Etéreo (mín.)	%	3,40
Proteína Bruta (mín.)	%	25,00
Fibra Bruta (máx.)	%	6,80
Minerales Totales (máx.)	%	40,00
Calcio (mín.)	g/kg	32,00
Fósforo (mín)	g/kg	11,00
Magnesio (mín.)	g/kg	0,40
Sodio (mín.)	g/kg	40,00
Azufre (mín.)	g/kg	1,80
Cobalto (mín.)	mg/kg	2,90
Cobre (mín.)	mg/kg	121,00
Cromo (mín.)	mg/kg	1,10
Hierro (mín.)	mg/kg	66,0
Yodo (mín.)	mg/kg	5,30
Manganeso (mín.)	mg/kg	400,00
Selenio (mín.)	mg/kg	3,50
Zinc (mín.)	mg/kg	524,00
Vitamina A (mín.)	UI/kg	88.150,00
Vitamina D (mín.)	UI/kg	11.000,00
Vitamina E (mín.)	UI/kg	275,00
Monensina Sódica (mín.)	mg/kg	132,00

BOVINOS DE CARNE



Proteico Chaco

► Indicaciones de Uso:

Suplemento mineral de auto consumo que en su formulación contempla los requerimientos nutricionales ideales para animales en fase de recría, engorde, terminación o reproducción manejados en pastura verde o seca. Productos listo para uso. hacer la adaptacion de los animales por 7 días ofreciendo 50 gramos del producto/100 kg de peso vivo por día. Después de la adaptación dejar el producto disponible para que el animal regule el consumo (auto consumo). No debe faltar el producto en la batea. Consumo esperado después de la adaptación: 50 hasta 150 gramos/100 kg de peso vivo. Se necesita de 4 hasta 12 cm lineal/animal de batea.

► Aditivos:

Núcleo mineral de fuente orgánica, vitaminas, promotor de crecimiento, secuestrante de micotoxinas.

Composición Nutricional

NUTRIENTES	UNIDAD	BASE SECA
Energía Metabolizable (mín)	Kcal/kg	1.700
Extracto Etéreo (mín.)	%	3,40
Proteína Bruta (mín.)	%	40,00
Fibra Bruta (máx.)	%	6,80
Minerales Totales (máx.)	%	40,00
Calcio (mín.)	g/kg	36,50
Fósforo (mín)	g/kg	16,00
Magnesio (mín.)	g/kg	0,70
Sodio (mín.)	g/kg	35,00
Azufre (mín.)	g/kg	3,00
Cobalto (mín.)	mg/kg	4,90
Cobre (mín.)	mg/kg	208,00
Cromo (mín.)	mg/kg	1,90
Hierro (mín.)	mg/kg	114,0
Yodo (mín.)	mg/kg	10,00
Manganeso (mín.)	mg/kg	690,00
Selenio (mín.)	mg/kg	6,00
Zinc (mín.)	mg/kg	902,00
Vitamina A (mín.)	UI/kg	151.600,00
Vitamina D (mín.)	UI/kg	18.950,00
Vitamina E (mín.)	UI/kg	474,00
Monensina Sódica (mín.)	mg/kg	227,00

Proteico Chaco Alto Consumo

► Indicaciones de Uso:

Suplemento mineral proteico de alto consumo que en su formulación contempla los requerimientos nutricionales ideal para animales en fase de recría, engorde o reproducción manejados en la zona del Chaco. Producto listo para uso. Hacer la adaptación de los animales por 7 días mezclando una bolsa de PROTEICO CHACO ALTO CONSUMO con una bolsa de suplemento mineral. Después de la adaptación dejar el producto disponible para que el animal regule el consumo (auto consumo). No dejar faltar el producto en la batea. Consumo esperado de 200 hasta 300 gramos/100 kg de peso vivo. Se necesita 1 metro de batea con acceso a ambos lados para 8 animales.

► Aditivos:

Núcleo mineral de fuente orgánica, vitaminas, promotor de crecimiento, secuestrante de micotoxinas.

Composición Nutricional

NUTRIENTES	UNIDAD	BASE SECA
Energía Metabolizable (mín)	Kcal/kg	2.400
Proteína Bruta (mín.)	%	45,0
Humedad (máx.)	%	12,0
Calcio (mín.)	g/kg	20,0
Fósforo (mín)	g/kg	10,0
Magnesio (mín.)	g/kg	0,3
Sodio (mín.)	g/kg	20,0
Azufre (mín.)	g/kg	1,5
Cobalto (mín.)	mg/kg	2,5
Cobre (mín.)	mg/kg	106,0
Cromo (mín.)	mg/kg	0,97
Hierro (mín.)	mg/kg	57,0
Yodo (mín.)	mg/kg	5,0
Manganeso (mín.)	mg/kg	350,0
Selenio (mín.)	mg/kg	3,0
Zinc (mín.)	mg/kg	460,0
Vitamina A (mín.)	UI/kg	77.000
Vitamina D (mín.)	UI/kg	9.600
Vitamina E (mín.)	UI/kg	240
Monensina Sódica (mín.)	mg/kg	115

BOVINOS DE CARNE



Engorde 40

► Indicaciones de Uso:

Suplemento mineral para bovinos de carne en fase de engorde. Producto de uso continuo. Poner el producto en comedero o batea y dejar disponible a los animales (ad libitum). No necesita de adaptación. Consumo estimado de 40 hasta 60 gramos/animal. Se necesita 1 metro de batea/50 animales (acceso a ambos lados).

► Nómima de materias primas:

Calcáreo Calcítico, Fosfato Bicálcico, Azufre, Cloruro de Sodio, Óxido de Magnesio, Sulfato de Cobre, Sulfato de Zinc, Sulfato de Manganese, Yodato de Calcio, Sulfato de Cobalto, Selenito de Sodio y Aromatizante. Sulfato de Magnesio, Óxido de Manganese, Óxido de Zinc y Yodato de Potasio.

Composición Nutricional

NUTRIENTES	UNIDAD	CANTIDAD
Calcio	g/kg	167
Fósforo	g/kg	40
Magnesio	g/kg	12
Sodio	g/kg	140
Azufre	g/kg	10
Cobalto	mg/kg	36
Cobre	mg/kg	600
Yodo	mg/kg	36
Manganese	mg/kg	1200
Selenio	mg/kg	10
Zinc	mg/kg	1200

Recría 60

► Indicaciones de Uso:

Suplemento mineral para bovinos de carne en fase de recría. Producto de uso continuo. Poner el producto en comedero o batea y dejar disponible a los animales (ad libitum). No necesita de adaptación. Consumo estimado de 60 hasta 80 gramos/animal. Se necesita 1 metro de batea/50 animales (acceso a ambos lados).

► Nómima de materias primas:

Calcáreo Calcítico, Fosfato Bicálcico, Azufre, Cloruro de Sodio, Óxido de Magnesio, Sulfato de Cobre, Sulfato de Zinc, Sulfato de Manganese, Yodato de Calcio, Sulfato de Cobalto, Selenito de Sodio y Aromatizante. Sulfato de Magnesio, Óxido de Manganese, Óxido de Zinc y Yodato de Potasio.

Composición Nutricional

NUTRIENTES	UNIDAD	CANTIDAD
Calcio	g/kg	168
Fósforo	g/kg	60
Magnesio	g/kg	13
Sodio	g/kg	120
Azufre	g/kg	12
Cobalto	mg/kg	45
Cobre	mg/kg	750
Yodo	mg/kg	45
Manganese	mg/kg	1500
Selenio	mg/kg	12
Zinc	mg/kg	2500

BOVINOS DE CARNE



Reproducción 80

► Indicaciones de Uso:

Suplemento mineral para bovinos de carne en fase de reproducción. Producto de uso continuo. Poner el producto en comedero o batea y dejar disponible a los animales (ad libitum). No necesita de adaptación. Consumo estimado de 80 hasta 120 gramos/animal. Se necesita 1 metro de batea/50 animales (acceso a ambos lados).

► Nómina de materias primas:

Calcáreo Calcítico, Fosfato Bicálcico, Azufre, Cloruro de Sodio, Óxido de Magnesio, Sulfato de Cobre, Sulfato de Zinc, Sulfato de Manganeso, Yodato de Calcio, Sulfato de Cobalto, Selenito de Sodio y Aromatizante. Sulfato de Magnesio, Óxido de Manganeso, Óxido de Zinc y Yodato de Potasio.

Composición Nutricional

NUTRIENTES	UNIDAD	CANTIDAD
Calcio	g/kg	168
Fósforo	g/kg	80
Magnesio	g/kg	14
Sodio	g/kg	100
Azufre	g/kg	15
Cobalto	mg/kg	54
Cobre	mg/kg	900
Yodo	mg/kg	54
Manganeso	mg/kg	1800
Selenio	mg/kg	15
Zinc	mg/kg	3000

Concentrado Proteico

► Indicaciones de Uso:

Concentrado proteico (polvo o peletizado) que en su formulación contempla los requerimientos nutricionales de recría, engorde y terminación. Producto ideal para hacer balanceado para semi confinamiento o confinamiento. Según la proporción de acuerdo a la categoría animal: - Recría=> 60% de maíz + 40% del producto => (Balanceado de 18%PB) - Engorde => 68% de maíz + 32% del producto => (Balanceado de 16%PB) - Terminación => 80% de maíz + 20% del producto => (Balanceado de 14%PB). Ofrecer la mezcla de 1,0% hasta 1,5% del peso vivo. Si el suministro supera el 1,0% del P.V. se recomienda hacerlo fraccionando la dosis en 2 veces al día. Se necesita 1 metro de batea lineal con acceso a ambos lados para 3 animales o 35 cm/animal con acceso a un lado. En sistema de semi confinamiento, mantener un suplemento mineral correspondiente a la categoría disponible en la batea. NO APTO PARA EQUINOS.

► Aditivos:

Núcleo mineral de fuente orgánica, vitaminas, promotor de crecimiento, secuestrante de micotoxinas.

Composición Nutricional

NUTRIENTES	UNIDAD	BASE SECA
Energía Metabolizable (mín.)	Kcal/kg	2,600
Extracto Etéreo (mín.)	%	3,40
Proteína Bruta (mín.)	%	32,00
Fibra Bruta (máx.)	%	6,80
Minerales Totales (máx.)	%	28,00
Calcio (mín.)	%	2,98
Fósforo (mín.)	%	1,24
Magnesio (mín.)	%	0,03
Sodio (mín.)	%	0,93
Azufre (mín.)	%	0,13
Cobalto (mín.)	mg/kg	2,14
Cobre (mín.)	mg/kg	90,46
Cromo (mín.)	mg/kg	0,82
Hierro (mín.)	mg/kg	49,34
Yodo (mín.)	mg/kg	4,34
Manganeso (mín.)	mg/kg	299,33
Selenio (mín.)	mg/kg	2,63
Zinc (mín.)	mg/kg	391,43
Vitamina A (mín.)	UI/kg	65790,00
Vitamina D (mín.)	UI/kg	8220,00
Vitamina E (mín.)	UI/kg	205,58
Monensina Sódica (mín.)	mg/kg	98,68

BOVINOS DE CARNE



Feed Lot

Indicaciones de Uso:

Núcleo mineral, vitamínico, tamponante y probiótico para bovinos de carne manejados en sistema de semi confinamiento o confinamiento. Producto listo para uso. No se necesita adaptación. Incluir el producto en la proporción de 3,0% en la mezcla del balanceado. Indicación de consumo: 30 hasta 60 gramos/100 kg de peso vivo.

Nómina de materias primas:

Calcáreo Calcítico, Fosfato Bicálcico, Azufre, Cloruro de Sodio, Óxido de Magnesio, Sulfato de Cobre, Sulfato de Zinc, Sulfato de Manganeseo, Yodato de Calcio, Sulfato de Cobalto, Selenito de Sodio, Aromatizante, Vitamina A, Vitamina D3, Vitamina E, Monensina Sódica, Ruminobacter amylophilum, Ruminobacter succinogenes, Bacillus cereus, Enterococcus faecium, Lactobacillus acidophilus, Succinovibrio dextrinosolvens y Saccharomyces cerevisiae. Sulfato de Magnesio, Óxido de Manganeseo, Óxido de Zinc y Yodato de Potasio.

Nitro

Indicaciones de Uso:

Núcleo mineral, proteico, vitamínico, tamponante y probiótico para bovinos de carne manejados en sistema de semi confinamiento o confinamiento. Producto listo para uso. Contiene urea, necesita adaptación, consultar el departamento técnico para mejor utilización. Incluir el producto en la proporción de 5,0% en la mezcla del balanceado. Indicación de consumo: 50 hasta 70 gramos/100 kg de peso vivo.

Nómina de materias primas:

Calcáreo Calcítico, Fosfato Bicálcico, Azufre, Cloruro de Sodio, Óxido de Magnesio, Sulfato de Cobre, Sulfato de Zinc, Sulfato de Manganeseo, Yodato de Calcio, Sulfato de Cobalto, Selenito de Sodio, Urea, Aromatizante, Vitamina A, Vitamina D3, Vitamina E, Monensina Sódica, Ruminobacter amylophilum, Ruminobacter succinogenes, Bacillus cereus, Enterococcus faecium, Lactobacillus acidophilus, Succinovibrio dextrinosolvens y Saccharomyces cerevisiae. Sulfato de Magnesio, Óxido de Manganeseo, Óxido de Zinc y Yodato de Potasio.

Composición Nutricional

NUTRIENTES	UNIDAD	CANTIDAD
Calcio	g/kg	126
Fósforo	g/kg	13
Magnesio	g/kg	13
Sodio	g/kg	65
Azufre	g/kg	20
Cobalto	mg/kg	23
Cobre	mg/kg	290
Yodo	mg/kg	23
Manganeseo	mg/kg	780
Selenio	mg/kg	6
Zinc	mg/kg	1300
Vitamina A	UI/kg	58500
Vitamina D	UI/kg	5850
Vitamina E	UI/kg	58
Monensina Sódica	mg/kg	780
Ruminobacter amylophilum	UFC/kg	3,4 x 10E7
Ruminobacter succinogenes	UFC/kg	3,4 x 10E7
Bacillus cereus	UFC/kg	3,9 x 10E7
Enterococcus faecium	UFC/kg	3,9 x 10E7
Lactobacillus acidophilus	UFC/kg	3,9 x 10E7
Succinovibrio dextrinosolvens	UFC/kg	5,0 x 10E7
Saccharomyces cerevisiae	UFC/kg	2,3 x 10E7

Composición Nutricional

NUTRIENTES	UNIDAD	CANTIDAD
Proteína Bruta	%	100
Calcio	g/kg	126
Fósforo	g/kg	13
Magnesio	g/kg	13
Sodio	g/kg	65
Azufre	g/kg	20
Cobalto	mg/kg	23
Cobre	mg/kg	290
Yodo	mg/kg	23
Manganeseo	mg/kg	780
Selenio	mg/kg	6
Zinc	mg/kg	1300
Vitamina A	UI/kg	58500
Vitamina D	UI/kg	5850
Vitamina E	UI/kg	58
Monensina Sódica	mg/kg	780
Ruminobacter amylophilum	UFC/kg	3,4 x 10E7
Ruminobacter succinogenes	UFC/kg	3,4 x 10E7
Bacillus cereus	UFC/kg	3,9 x 10E7
Enterococcus faecium	UFC/kg	3,9 x 10E7
Lactobacillus acidophilus	UFC/kg	3,9 x 10E7
Succinovibrio dextrinosolvens	UFC/kg	5,0 x 10E7
Saccharomyces cerevisiae	UFC/kg	2,3 x 10E7

BOVINOS DE LECHE



Lechera A.P. Lacto Max

► Indicaciones de Uso:

Este alimento está indicado para vacas lecheras de alta producción suministrando 1 kg de balanceado cada 2,7 litros de leche producido o en su defecto 7 kg de balanceado para los primeros 10 litros de leche producidos y luego 1 kg de balanceado cada 3 litros de leche extra producidos. Siempre debe ser suministrado acompañado de una fuente de fibra (pastura, silaje o heno) de buena calidad. En lo posible suministrar el balanceado en el mayor número de frecuencias posibles ya que a mayor número de frecuencias de alimentación, mayor producción de leche.

► Aditivos:

Secuestrante de micotoxinas.

Composición Nutricional

NUTRIENTES	UNIDAD	CANTIDAD
Proteína Bruta (mín.)	%	24,6
Energía Metabolizable (mín.)	Kcal	2.900
Fibra Bruta (máx.)	%	5,6
Extracto Etéreo (mín.)	%	4
Ceniza (máx.)	%	7,3
Calcio (máx.)	%	1,2
Fósforo	%	0,8
Selenio	mg/kg	861
Cobre	mg/kg	29.615
Cobalto	mg/kg	700
Hierro	mg/kg	16.692
Manganeso	mg/kg	98.000
Zinc	mg/kg	120.615
Yodo	mg/kg	1.421
Vitamina A	UI/kg	20.000.000
Vitamina D	UI/kg	2.500.000
Vitamina E	UI/kg	6250
Monensina Sódica	ppm	32

Lechera A.P. Standard

► Indicaciones de Uso:

Este alimento está indicado para vacas lecheras de alta producción suministrando 1 kg de balanceado cada 2,7 litros de leche producido o en su defecto 7 kg de balanceado para los primeros 10 litros de leche producidos y luego 1 kg de balanceado cada 3 litros de leche extra producidos. Siempre debe ser suministrado acompañado de una fuente de fibra (pastura, silaje o heno) de buena calidad. En lo posible suministrar el balanceado en el mayor número de frecuencias posibles ya que a mayor número de frecuencias de alimentación, mayor producción de leche.

► Aditivos:

Promotores de crecimiento ruminal, secuestrante de micotoxinas.

Composición Nutricional

NUTRIENTES	UNIDAD	CANTIDAD
Proteína Bruta (mín.)	%	20
Energía Metabolizable (mín.)	Kcal	2.800
Fibra Bruta (máx.)	%	8,6
Extracto Etéreo (mín.)	%	3,8
Ceniza (máx.)	%	10
Calcio (máx.)	%	2,2
Fósforo	%	0,8
Selenio	mg/kg	880
Cobre	mg/kg	30.250
Cobalto	mg/kg	715
Hierro	mg/kg	61.000
Manganeso	mg/kg	100.100
Zinc	mg/kg	130.900
Yodo	mg/kg	1.452
Vitamina A	UI/kg	22.000.000
Vitamina D	UI/kg	2.750.000
Vitamina E	UI/kg	68.750
Monensina Sódica	ppm	24

BOVINOS DE LECHE



Lechera A.P. Súper Alta Energía

► Indicaciones de Uso:

Este alimento está indicado para vacas lecheras de alta producción suministrando 1 kg de balanceado cada 2,7 litros de leche producido o en su defecto 7 kg de balanceado para los primeros 10 litros de leche producidos y luego 1 kg de balanceado cada 3 litros de leche extra producidos. Siempre debe ser suministrado acompañado de una fuente de fibra (pastura, silo o heno) de buena calidad. En lo posible suministrar el balanceado en el mayor número de frecuencias posibles ya que a mayor número de frecuencias de alimentación, mayor producción de leche.

► Aditivos:

Promotores de crecimiento ruminal, secuestrante de micotoxinas.

Composición Nutricional

NUTRIENTES	UNIDAD	CANTIDAD
Proteína Bruta (mín.)	%	22
Energía Metabolizable (mín.)	Kcal	3.000
Fibra Bruta (máx.)	%	8,6
Extracto Etéreo (mín.)	%	3,8
Ceniza (máx.)	%	8,05
Calcio (máx.)	%	1,26
Fósforo	%	0,8
Selenio	mg/kg	880
Cobre	mg/kg	30.250
Cobalto	mg/kg	715
Hierro	mg/kg	61.000
Manganeso	mg/kg	100.100
Zinc	mg/kg	130.900
Yodo	mg/kg	1.452
Vitamina A	UI/kg	22.000.000
Vitamina D	UI/kg	2.750.000
Vitamina E	UI/kg	68.750
Monensina Sódica	ppm	24

Lechera A.P. Premium

► Indicaciones de Uso:

Este alimento está indicado para vacas lecheras de alta producción suministrando 1 kg de balanceado cada 2,5 litros de leche producido o en su defecto 7 kg de balanceado para los primeros 15 litros de leche producidos y luego 1 kg de balanceado cada 3 litros de leche extra producidos. Siempre debe ser suministrado acompañado de una fuente de fibra (pastura, silo o heno) de buena calidad. En lo posible suministrar el balanceado en el mayor número de frecuencias posibles ya que a mayor número de frecuencias de alimentación, mayor producción de leche.

► Aditivos:

Levaduras, promotores de crecimiento ruminal, secuestrante de micotoxinas.

Composición Nutricional

NUTRIENTES	UNIDAD	CANTIDAD
Proteína Bruta (mín.)	%	24
Energía Metabolizable (mín.)	Kcal	3.000
Fibra Bruta (máx.)	%	8,6
Extracto Etéreo (mín.)	%	3,8
Ceniza (máx.)	%	8,05
Calcio (máx.)	%	1,26
Fósforo	%	0,8
Selenio	mg/kg	880
Cobre	mg/kg	30.250
Cobalto	mg/kg	715
Hierro	mg/kg	61.000
Manganeso	mg/kg	100.100
Zinc	mg/kg	130.900
Yodo	mg/kg	1.452
Vitamina A	UI/kg	22.000.000
Vitamina D	UI/kg	2.750.000
Vitamina E	UI/kg	68.750
Monensina Sódica	ppm	24

BOVINOS DE LECHE



Lechera A.P. Premium Max

► Indicaciones de Uso:

Este alimento está indicado para vacas lecheras de alta producción suministrando 1 kg de balanceado cada 2,5 litros de leche producido o en su defecto 7 kg de balanceado para los primeros 15 litros de leche producidos y luego 1 kg de balanceado cada 3 litros de leche extra producidos. Siempre debe ser suministrado acompañado de una fuente de fibra (pastura, silo o heno) de buena calidad. En lo posible suministrar el balanceado en el mayor número de frecuencias posibles ya que a mayor número de frecuencias de alimentación, mayor producción de leche.

► Aditivos:

Levaduras, promotores de crecimiento ruminal, secuestrante de micotoxinas.

Composición Nutricional

NUTRIENTES	UNIDAD	CANTIDAD
Proteína Bruta (mín.)	%	24
Energía Metabolizable (mín.)	Kcal	3.000
Fibra Bruta (máx.)	%	8,6
Extracto Etéreo (mín.)	%	4,91
Ceniza (máx.)	%	9,5
Calcio (máx.)	%	1,2
Fósforo	%	1
Selenio	mg/kg	1.072
Cobre	mg/kg	36.855
Cobalto	mg/kg	871
Hierro	mg/kg	61.000
Manganeso	mg/kg	121.958
Zinc	mg/kg	130.900
Yodo	mg/kg	1.767
Vitamina A	UI/kg	26.804.123
Vitamina D	UI/kg	3.350.515
Vitamina E	UI/kg	83.762
Monensina Sódica	ppm	40,2

Proteico Energy

► Indicaciones de Uso:

Usado en forma directa para su consumo. Puede ser mezclado con cereales según criterio técnico para formular una dieta balanceada. NO APTO PARA EQUINOS.

► Aditivos:

Promotores de crecimiento ruminal, secuestrante de micotoxinas.

Composición Nutricional

NUTRIENTES	UNIDAD	CANTIDAD
Proteína Bruta (mín.)	%	31,3
Energía Metabolizable	Kcal	3.079
Fibra Bruta (máx.)	%	6,71
Extracto Etéreo (mín.)	%	7,4
Minerales Totales	%	14,9
Calcio	%	2,4
Fósforo	%	1,37
Selenio	mg/kg	1.455
Cobre	mg/kg	39.193
Cobalto	mg/kg	929
Hierro	mg/kg	22.284
Manganeso	mg/kg	161.254
Zinc	mg/kg	229.563
Yodo	mg/kg	1.903
Vitamina A	UI/kg	28.779.000
Vitamina D	UI/kg	3.583.000
Vitamina E	UI/kg	89.585
Monensina Sódica	ppm	42,55

BOVINOS DE LECHE



Proteico Max

► Indicaciones de Uso:

Usado en forma directa para su consumo. Puede ser mezclado con cereales según criterio técnico para formular una dieta balanceada. NO APTO PARA EQUINOS.

► Aditivos:

Promotores de crecimiento ruminal, secuestrante de micotoxinas.

Composición Nutricional

NUTRIENTES	UNIDAD	CANTIDAD
Proteína Bruta (mín.)	%	40,4
Energía Metabolizable	Kcal	2.923
Fibra Bruta (máx.)	%	5,6
Extracto Etéreo (mín.)	%	3,37
Minerales Totales	%	8
Calcio	%	2.4
Fósforo	%	1.0
Selenio	mg/kg	1.573
Cobre	mg/kg	56.242
Cobalto	mg/kg	1.237
Hierro	mg/kg	31.900
Manganeso	mg/kg	423.000
Zinc	mg/kg	230.000
Yodo	mg/kg	2.700
Vitamina A	UI/kg	40.495.000
Vitamina D	UI/kg	5.586.000
Vitamina E	UI/kg	128.161
Monensina Sódica	ppm	61.8

Ternero Iniciador

► Indicaciones de Uso:

Comenzar a ofrecer a partir de los 5 día de vida en bajas cantidades (100 gramos) ir aumentando gradualmente el consumo hasta llegar a los 2 kg de consumo continuo del mismo durante una semana cuando el ternero tiene entre 60 a 75 días dependiendo de la cantidad de leche suministrada. Luego que el ternero se desteta es recomendable su uso como balanceado hasta los 150 días de edad.

► Aditivos:

Núcleo mineral de fuente orgánica, vitaminas, promotores de crecimiento ruminal, secuestrante de micotoxinas. Contiene monensina.

Composición Nutricional

NUTRIENTES	UNIDAD	CANTIDAD
Proteína Bruta (mín.)	%	24
Energía Metabolizable (mín.)	Kcal	3.300
Fibra Bruta (máx.)	%	4
Extracto Etéreo (mín.)	%	4
Minerales Totales	%	6,2
Calcio (máx.)	%	0,9
Fósforo	%	0,65
Selenio	mg/kg	700
Cobre	mg/kg	24.000
Cobalto	mg/kg	640
Hierro	mg/kg	60.000
Manganeso	mg/kg	79.000
Zinc	mg/kg	104.000
Yodo	mg/kg	1.300
Vitamina A	UI/kg	17.550.000
Vitamina D	UI/kg	2.200.000
Vitamina E	UI/kg	5.460

BOVINOS DE LECHE



Vaquilla Crecimiento

► Indicaciones de Uso:

Ofrecer diariamente entre el 1% y el 2.5% del peso vivo del animal a suplementar dependiendo del plan nutricional, el objetivo de producción y de la oferta de pastura o fibra. Siempre suministrar fibra de buena calidad como complemento. Suministrar preferentemente en horarios vespertinos, complementar la dieta con agua limpia y fresca. Si el suministro supera el 1.5% del peso vivo dividir la cantidad de balanceado a suministrar en 2 o más veces.

► Aditivos:

Promotores de crecimiento ruminal, secuestrante de micotoxinas.

Composición Nutricional

NUTRIENTES	UNIDAD	CANTIDAD
Proteína Bruta (mín.)	%	16
Energía Metabolizable (mín.)	Kcal	2.800
Fibra Bruta (máx.)	%	11,2
Extracto Etéreo (mín.)	%	2,88
Minerales Totales	%	8
Calcio (máx.)	%	1,06
Fósforo	%	0,57
Selenio	mg/kg	800
Cobre	mg/kg	27.000
Cobalto	mg/kg	640
Hierro	mg/kg	60.000
Manganeso	mg/kg	90.000
Zinc	mg/kg	117.000
Yodo	mg/kg	1.300
Vitamina A	UI/kg	16.000.000
Vitamina D	UI/kg	2.450.000
Vitamina E	UI/kg	5.700
Monensina Sódica	ppm	24

Recría Vaquilla

► Indicaciones de Uso:

Ofrecer diariamente entre el 1% y el 2.5% del peso vivo del animal a suplementar dependiendo del plan nutricional, el objetivo de producción y de la oferta de pastura o fibra. Siempre suministrar fibra de buena calidad como complemento. Suministrar preferentemente en horarios vespertinos, complementar la dieta con agua limpia y fresca. Si el suministro supera el 1.5% del peso vivo dividir la cantidad de balanceado a suministrar en 2 o más veces.

► Aditivos:

Promotores de crecimiento ruminal, secuestrante de micotoxinas

Composición Nutricional

NUTRIENTES	UNIDAD	CANTIDAD
Proteína Bruta (mín.)	%	20
Energía Metabolizable (mín.)	Kcal	3.050
Fibra Bruta (máx.)	%	11,2
Extracto Etéreo (mín.)	%	2,88
Minerales Totales	%	8
Calcio (máx.)	%	1,06
Fósforo	%	0,57
Selenio	mg/kg	800
Cobre	mg/kg	27.000
Cobalto	mg/kg	640
Hierro	mg/kg	60.000
Manganeso	mg/kg	90.000
Zinc	mg/kg	117.000
Yodo	mg/kg	1.300
Vitamina A	UI/kg	19.550.000
Vitamina D	UI/kg	2.450.000
Vitamina E	UI/kg	5.700
Monensina Sódica	ppm	24

BOVINOS DE LECHE



Lechera Pre Parto

► Indicaciones de Uso:

Este alimento está indicado para vacas lecheras en periodo preparto. Suministrar entre 3 kg a 5 kg por vaca por día dependiendo del tamaño corporal del animal. Suministrar con una fuente adecuada de fibra que cubra los requerimientos nutricionales de la categoría.

► Aditivos:

Levaduras, promotores de crecimiento ruminal, secuestrante de micotoxinas.

Composición Nutricional

NUTRIENTES	UNIDAD	CANTIDAD
Proteína Bruta (mín.)	%	22
Energía Metabolizable (mín.)	Kcal	2.800
Fibra Bruta (máx.)	%	8,6
Extracto Etéreo (mín.)	%	3,8
Ceniza (máx.)	%	8,05
Calcio (máx.)	%	2
Fósforo	%	0,8
Selenio	mg/kg	1000
Cobre	mg/kg	30.250
Cobalto	mg/kg	715
Hierro	mg/kg	61.000
Manganeso	mg/kg	100.100
Zinc	mg/kg	130.900
Yodo	mg/kg	1.452
Vitamina A	UI/kg	22.000.000
Vitamina D	UI/kg	2.750.000
Vitamina E	UI/kg	68.750
Monensina Sódica	ppm	24

Recría Max

► Indicaciones de Uso:

Núcleo de minerales, mejorador de desempeño, con reguladores de PH ruminal, levaduras y vitaminas. Destinado a la formulación de raciones para alimentación de animales en la fase de recría.

Se recomienda un consumo mínimo de 20gr a 30 gr cada 100kg de peso vivo del animal por día.

► Aditivos:

Ionóforo (Monensina).

Composición Nutricional

NUTRIENTES	UNIDAD	CANTIDAD
Calcio	gr/kg	272
Fósforo	gr/kg	38
Magnesio	gr/kg	6
Sodio	gr/kg	43
Azufre	gr/kg	19
Cobre	mg/kg	869
Zinc	mg/kg	3.347
Selenio	mg/kg	24
Manganeso	mg/kg	2.551
Iodo	mg/kg	29
Cobalto	mg/kg	25
Hierro	mg/kg	0
Cromo	mg/kg	13
Vitamina A	UI/kg	181.538
Vitamina D	UI/kg	57.901
Vitamina E	UI/kg	717
Monensina	mg/kg	955

BOVINOS DE LECHE



Lactación Standard

► Indicaciones de Uso:

Núcleo de minerales, mejorador de desempeño y vitaminas. Destinado a la formulación de raciones para alimentación de vacas lecheras en lactación. Añadir de 50 a 70kg por tonelada de ración o de acuerdo con la recomendación de un nutricionista. Se recomienda un consumo mínimo de 300 gr por día.

Límite de consumo: 300gr a 600 gr por día.

► Aditivos:

Ionóforo (Monensina).

Composición Nutricional

NUTRIENTES	UNIDAD	CANTIDAD
Calcio	gr/kg	250
Fósforo	gr/kg	30
Magnesio	gr/kg	10
Sodio	gr/kg	67
Azufre	gr/kg	10
Cobre	mg/kg	1.138
Zinc	mg/kg	3.978
Selenio	mg/kg	29
Manganeso	mg/kg	3.370
Iodo	mg/kg	36
Cobalto	mg/kg	33
Cromo	mg/kg	8,7
Vitamina A	UI/kg	191.109
Vitamina D	UI/kg	57.332
Vitamina E	UI/kg	573
Ionoforo	mg/kg	726

Lactación Súper

► Indicaciones de Uso:

Núcleo de minerales, mejorador de desempeño y vitaminas. Destinado a la formulación de raciones para alimentación de vacas lecheras en lactación. Añadir de 50 a 70kg por tonelada de ración o de acuerdo con la recomendación de un nutricionista. Se recomienda un consumo mínimo de 300 gr por día.

Límite de consumo: 300gr a 600 gr por día.

► Aditivos:

Ionóforo (Monensina), Biotina.

Composición Nutricional

NUTRIENTES	UNIDAD	CANTIDAD
Calcio	gr/kg	259
Fósforo	gr/kg	38
Magnesio	gr/kg	8
Sodio	gr/kg	57
Azufre	gr/kg	11
Cobre	mg/kg	1.115
Zinc	mg/kg	3.474
Selenio	mg/kg	28
Manganeso	mg/kg	2.613
Iodo	mg/kg	57
Cobalto	mg/kg	52
Cromo	mg/kg	19
Vitamina A	UI/kg	191.222
Vitamina D	UI/kg	68.840
Vitamina E	UI/kg	1.147
Biotina	mg/kg	76
Monensina	mg/kg	717

BOVINOS DE LECHE



Lactación Premium

► Indicaciones de Uso:

Núcleo de minerales, mejorador de desempeño, con reguladores de PH ruminal, levaduras y vitaminas. Destinado a la formulación de raciones para alimentación de vacas lecheras en lactación. Añadir de 50 a 70kg por tonelada de ración o de acuerdo con la recomendación de un nutricionista. Se recomienda un consumo mínimo de 300 gr por día.

Límite de consumo: 300gr a 600 gr por día

► Aditivos:

Ionóforo (Monensina), Biotina, Tamponante, Levaduras.

Composición Nutricional

NUTRIENTES	UNIDAD	CANTIDAD
Calcio	gr/kg	215
Fósforo	gr/kg	38
Magnesio	gr/kg	38
Sodio	gr/kg	57
Azufre	gr/kg	0,6
Cobre	mg/kg	770
Zinc	mg/kg	2.696
Selenio	mg/kg	24
Manganeso	mg/kg	1.860
Iodo	mg/kg	38
Cobalto	mg/kg	33
Cromo	mg/kg	16
Vitamina A	UI/kg	159.294
Vitamina D	UI/kg	57.346
Vitamina E	UI/kg	956
Biotina	mg/kg	64
Monensina	mg/kg	573
Levaduras	Ufc/kg	20,7x10 ⁹

Lactación Master

► Indicaciones de Uso:

Núcleo de minerales, mejorador de desempeño, con reguladores de PH ruminal, levaduras y vitaminas. Destinado a la formulación de raciones para alimentación de vacas lecheras en lactación. Añadir de 50 a 70kg por tonelada de ración o de acuerdo con la recomendación de un nutricionista. Se recomienda un consumo mínimo de 200 gr por día.

Límite de consumo: 200gr a 400 gr por día.

► Aditivos:

Ionóforo (Monensina), Biotina, Levaduras.

Composición Nutricional

NUTRIENTES	UNIDAD	CANTIDAD
Calcio	gr/kg	180
Fósforo	gr/kg	53
Magnesio	gr/kg	31
Sodio	gr/kg	100
Azufre	gr/kg	19
Cobre	mg/kg	1.355
Zinc	mg/kg	3.976
Selenio	mg/kg	34
Manganeso	mg/kg	3.409
Iodo	mg/kg	62
Cobalto	mg/kg	57
Cromo	mg/kg	15
Vitamina A	UI/kg	335.174
Vitamina D	UI/kg	115.555
Vitamina E	UI/kg	1.926
Biotina	mg/kg	57
Monensina	mg/kg	814
Levaduras	Ufc/kg	7,8x 10E ⁹

OVINOS



Iniciador

► Indicaciones de Uso:

Balanceado peletizado que en su formulación contempla los requerimientos nutricionales de las terneras desde la semana de vida hasta los seis meses de edad. Especialmente formulado para cumplir con los requerimientos de los animales de alto potencial genético ya que aumenta la ganancia de peso y fundamentalmente el desarrollo muscular de los terneros. Comenzar a ofrecer a partir de los 7 días de vida en bajas cantidades (0,5% del PV) ir aumentando gradualmente el consumo hasta llegar al 1% del PV del mismo. Suministrar fibra de buena calidad (heno o pasto verde).

Composición Nutricional

NUTRIENTES	BASE TAL CUAL	BASE SECA
Proteína Bruta (min)	20%	22%
Energía Metabolizable (min)	2.650 Kcal.	3.000 Kcal.
Fibra Bruta	11%	13%
Extracto Etereo (min)	4,4%	5%
Minerales Totales	5,5%	6,2%
Calcio	0,8%	0,9%
Fósforo	0,8%	0,9%
Selenio (mg por T)	450	500
Cobre (mg por T)	15700	18.000
Zinc (mg por T)	92.000	104.000
Yodo (mg por T)	1.150	1.300
Vitamina A (ui por T)	15.640.000	17.550.000
Vitamina D (ui por T)	1.950.000	2.200.000
Vitamina E (ui por T)	4.860	5.460

Borrego/a

► Indicaciones de Uso:

Es un alimento elaborado para cubrir los requerimientos nutricionales de los borregos, en época de crecimiento y desarrollo. Se debe suministrar desde la época del destete en forma gradual hasta alcanzar el consumo de 1% de peso vivo. Acompañar con forraje de buena calidad y agua limpia.

Composición Nutricional

NUTRIENTES	BASE SECA
Proteína cruda (PC)	Mínimo 20%
Fibra Cruda (FC)	Máximo 13,63%
Grasa (Grasa)	Mínimo 2,27%
Humedad	Máximo 13%
Calcio (Ca)	Máximo 0,34%
Fósforo (P)	Mínimo 0,45%
Ceniza (Ceniz)	Máximo 5,11%
EM Kcal/kg	2800

OVINOS



Hembra

■ Indicaciones de Uso:

Es un alimento elaborado para cubrir los requerimientos nutricionales de las ovejas, en época de reproducción, gestación y lactancia. Se debe suministrar desde la época de servicio en forma gradual hasta alcanzar el consumo de 1,3% de peso vivo. Acompañar con forraje de buena calidad y agua limpia.

Reproductor

■ Indicaciones de Uso:

Es un alimento elaborado para cubrir los requerimientos nutricionales de los carneros en época de reproducción. Se debe suministrar desde 60 días antes de la época de servicio en forma gradual a razón de 1% de peso vivo. Acompañar de forraje de buena calidad y agua limpia.

Ovino MAX

■ Indicaciones de Uso:

Suplemento mineral para ovinos machos y hembras a partir del destete. Producto de uso continuo. Poner el producto en comedero o batea y dejar disponible a los animales (ad libitum). No necesita de adaptación. Consumo estimado de 10 hasta 25 gramos/ animal/ día. Se necesita 1 metro de batea/ 50 animales (acceso a ambos lados).

Composición Nutricional

NUTRIENTES		BASE SECA
Proteína cruda (PC)	Mínimo	18%
Fibra Cruda (FC)	Máximo	13,79%
Grasa (Grasa)	Mínimo	2,29%
Humedad	Máximo	13%
Calcio (Ca)	Máximo	0,91%
Fósforo (P)	Mínimo	0,34%
Ceniza (Ceniz)	Máximo	5,17%
EM Kcal/kg		2800

Composición Nutricional

NUTRIENTES		BASE SECA
Proteína cruda (PC)	Mínimo	18%
Fibra Cruda (FC)	Máximo	17,04%
Grasa (Grasa)	Mínimo	2,27%
Humedad	Máximo	13%
Calcio (Ca)	Máximo	1,13%
Fósforo (P)	Mínimo	0,34%
Ceniza (Ceniz)	Máximo	4,54%
EM Kcal/kg		2800

Composición Nutricional

NUTRIENTES	UNIDAD	CANTIDAD
Calcio	g/kg	137
Fósforo	g/kg	90
Magnesio	g/kg	8
Sodio	g/kg	140
Azufre	g/kg	9
Cobalto	g/kg	32
Cobre	g/kg	525
Yodo	g/kg	32
Manganeso	g/kg	1.050
Selenio	g/kg	9
Zinc	g/kg	1.750



Trabajo

► Indicaciones de Uso:

Es un alimento elaborado para cubrir los requerimientos nutricionales de caballos de trabajo diario y mantenimiento, ya sean manejados a campo o en establos. Se debe suministrar al animal de 5 a 6 kg por día, dependiendo del estado corporal que presenten. Complementar con forrajes.

Composición Nutricional

NUTRIENTES		BASE SECA
Proteína cruda (PC)	Mínimo	18%
Fibra Cruda (FC)	Máximo	6,89%
Grasa (Grasa)	Mínimo	2,87%
Humedad	Máximo	13%
Calcio (Ca)	Máximo	0,68%
Fósforo (P)	Mínimo	0,57%
Ceniza (Ceniz)	Máximo	3,44%
EM Kcal/kg		2800


Equino Max

► Indicaciones de Uso:

Suplemento mineral para equinos. Producto de uso continuo. Poner el producto en comedero o batea y dejar disponible a los animales (ad libitum). No necesita de adaptación. Consumo estimado de 50 hasta 150 gramos/animal/día. Se necesita 1 metro de batea/ 50 animales (acceos a ambos lados).

Composición Nutricional

NUTRIENTES	UNIDAD	CANTIDAD
Calcio	g/kg	175
Fósforo	g/kg	50
Magnesio	g/kg	13
Sodio	g/kg	120
Azufre	g/kg	11
Cobalto	g/kg	40
Cobre	g/kg	675
Yodo	g/kg	40
Manganeso	g/kg	1.350
Selenio	g/kg	11
Zinc	g/kg	2.250



Integral

■ Indicaciones de Uso:

Es un alimento balanceado para suministrar a las aves en todas sus etapas de crianza, supliendo los requerimientos nutricionales básicos en cada etapa, tanto en crianza a piso como a jaula. Ofrecer a voluntad.

Composición Nutricional

NUTRIENTES		BASE SECA
Proteína cruda (PC)	Mínimo	16%
Fibra Cruda (FC)	Máximo	12%
Grasa (Grasa)	Mínimo	2,64%
Humedad	Máximo	13%
Calcio (Ca)	Máximo	1,20%
Fósforo (P)	Mínimo	0,30%
Ceniza (Ceniz)	Máximo	8,04%
EM Kcal/kg		2870

Ponedora Iniciador

■ Indicaciones de Uso:

Es un alimento balanceado con nutrientes de alta calidad, elaborado para ser suministrado a las pollitas en las primeras dos semanas de vida. Se debe suministrar a voluntad desde el día 1 hasta los 14 días de vida, en tolvas o comederos automáticos.

Composición Nutricional

NUTRIENTES		BASE SECA
Proteína cruda (PC)	Mínimo	25%
Fibra Cruda (FC)	Máximo	3,44%
Grasa (Grasa)	Mínimo	2,87%
Humedad	Máximo	13%
Calcio (Ca)	Máximo	1,26%
Fósforo (P)	Mínimo	0,57%
Ceniza (Ceniz)	Máximo	8,04%
EM Kcal/kg		2800


Ponedora Crecimiento

■ Indicaciones de Uso:

Es un alimento balanceado diseñado para aportar nutrientes necesarios en el crecimiento de las pollitas, se debe suministrar a voluntad desde la séptima semana de vida hasta 18 semanas de vida, en tolvas o comederos automáticos.

Composición Nutricional

NUTRIENTES		BASE SECA
Proteína cruda (PC)	Mínimo	21%
Fibra Cruda (FC)	Máximo	3,79%
Grasa (Grasa)	Mínimo	2,64%
Humedad	Máximo	13%
Calcio (Ca)	Máximo	2,06%
Fósforo (P)	Mínimo	0,57%
Ceniza (Ceniz)	Máximo	8,62%
EM Kcal/kg		2800



Ponedora Postura

■ Indicaciones de Uso:

Núcleo de minerales, mejorador de desempeño, con reguladores de PH ruminal, levaduras y vitaminas. Destinado a la formulación de raciones para alimentación de animales en la fase de recría.

Se recomienda un consumo mínimo de 20gr a 30 gr cada 100kg de peso vivo del animal por día.

Composición Nutricional

NUTRIENTES		BASE SECA
Proteína cruda (PC)	Mínimo	21%
Fibra Cruda (FC)	Máximo	4,59%
Grasa (Grasa)	Mínimo	2,64%
Humedad	Máximo	13%
Calcio (Ca)	Máximo	2,87%
Fósforo (P)	Mínimo	0,57%
Ceniza (Ceniz)	Máximo	8,04%
EM Kcal/kg		2870

Parrillero Iniciador

■ Indicaciones de Uso:

Es un alimento balanceado con nutrientes de alta calidad, elaborado para ser suministrado a los pollitos en las primeras dos semanas de vida. Se debe suministrar a voluntad desde el día 1 hasta los 14 días de vida, en tolvas o comederos automáticos.

Composición Nutricional

NUTRIENTES		BASE SECA
Proteína cruda (PC)	Mínimo	25%
Fibra Cruda (FC)	Máximo	3,44%
Grasa (Grasa)	Mínimo	2,87%
Humedad	Máximo	13%
Calcio (Ca)	Máximo	1,26%
Fósforo (P)	Mínimo	0,57%
Ceniza (Ceniz)	Máximo	8,04%
EM Kcal/kg		2800


Parrillero Crecimiento

■ Indicaciones de Uso:

Es un alimento balanceado diseñado para aportar nutrientes necesarios en el crecimiento de los pollitos, se debe suministrar a voluntad desde el día 15 hasta 28 días de vida, en tolvas o comederos automáticos.

Composición Nutricional

NUTRIENTES		BASE SECA
Proteína cruda (PC)	Mínimo	25%
Fibra Cruda (FC)	Máximo	3,44%
Grasa (Grasa)	Mínimo	2,87%
Humedad	Máximo	13%
Calcio (Ca)	Máximo	1,26%
Fósforo (P)	Mínimo	0,57%
Ceniza (Ceniz)	Máximo	8,04%
EM Kcal/kg		2800



Parrillero Terminador

► **Indicaciones de Uso:**

Es un alimento balanceado con aporte de nutrientes ricos en energía y proteína, adecuado para la terminación de los parrilleros. Se debe suministrar a voluntad desde el día 29 de vida hasta la faena de los pollos, en tolvas o comederos automáticos.

Composición Nutricional

NUTRIENTES		BASE SECA
Proteína cruda (PC)	Mínimo	21%
Fibra Cruda (FC)	Máximo	3,44%
Grasa (Grasa)	Mínimo	2,87%
Humedad	Máximo	13%
Calcio (Ca)	Máximo	1,26%
Fósforo (P)	Mínimo	0,57%
Ceniza (Ceniz)	Máximo	8,04%
EM Kcal/kg		2870

PORCINOS



Iniciador

■ Indicaciones de Uso:

Es un alimento balanceado formulado para suministrar a partir del destete, con peso de alrededor de 12 kg. Varía según genética y será suministrado hasta los 25 kg de peso vivo.

Composición Nutricional

NUTRIENTES		BASE SECA
Proteína cruda (PC)	Mínimo	22%
Fibra Cruda (FC)	Máximo	3,44%
Grasa (Grasa)	Mínimo	3,44%
Humedad	Máximo	13%
Calcio (Ca)	Máximo	1,03%
Fósforo (P)	Mínimo	0,68%
Ceniza (Ceniz)	Máximo	8,04%
EM Kcal/kg		3000

Crecimiento

■ Indicaciones de Uso:

Es un alimento balanceado formulado para cubrir todos los requerimientos nutricionales de cerdos en fase de desarrollo y crecimiento. Suministrar a partir de los 25 kg de peso vivo hasta alcanzar 55 kg de peso vivo. Administrar a voluntad.

Composición Nutricional

NUTRIENTES		BASE SECA
Proteína cruda (PC)	Mínimo	20%
Fibra Cruda (FC)	Máximo	2,98%
Grasa (Grasa)	Mínimo	2,29%
Humedad	Máximo	13%
Calcio (Ca)	Máximo	0,91%
Fósforo (P)	Mínimo	0,57%
Ceniza (Ceniz)	Máximo	8,04%
EM Kcal/kg		2800

Engorde

■ Indicaciones de Uso:

Es un alimento balanceado indicado para cerdos en fase de terminación. Ofrecer al animal a discreción, desde los 55 kg de peso hasta alcanzar el peso de faena deseado.

Composición Nutricional

NUTRIENTES		BASE SECA
Proteína cruda (PC)	Mínimo	16%
Fibra Cruda (FC)	Máximo	4,59%
Grasa (Grasa)	Mínimo	2,87%
Humedad	Máximo	13%
Calcio (Ca)	Máximo	0,57%
Fósforo (P)	Mínimo	0,57%
Ceniza (Ceniz)	Máximo	5,74%
EM Kcal/kg		2900



Nutrición Animal



BOVINOS DE CARNE / BOVINOS DE LECHE OVINOS / EQUINOS / AVES / PORCINOS

📍 **Planta Industrial:** Ruta 2, Km. 214 – J.E. Estigarribia (Campo 9)
(0528) 222 533 / (0984) 222 533 / info@probal.com.py

📍 **Loma Plata – Chaco:** Avda. Central c/ 3 de Noviembre
(0492) 252 490 / (0984) 147 211 / lomaplata@probal.com.py

📍 **Mariano Roque Alonso:** Ruta N° 9 Km. 17,5. Gral. Díaz c/ Cnel. López
(0984) 998 340 / roquealonso@probal.com.py

🌐 www.probal.com.py

 **PB MAX Nutrición Animal**